

GUIDE DE PROSPECTION - COURTILIERES

Nom latin	Nom vernaculaire	Période d'observation												Milieux	Remarque(s) complémentaire(s)			
		JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC					
<i>Gryllotalpa septemdecimchromosomica</i>	Courtillère provençale																Pas assez d'éléments pour l'instant	
<i>Gryllotalpa vineae</i>	Courtillère des vignes																Milieux secs et filtrants (pelouses sèches, substrats sableux...), vignes	
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Courtillère commune																Milieux mésophiles à hygrophiles	

NB : L'écoute nocturne constitue pour l'instant le meilleur moyen de détecter les courtilières. Les observations fortuites sont rares mais permettent souvent une identification. Par ailleurs, elles permettront de continuer à travailler à la définition de critères morphologiques fiables. Enfin, toute observation de terrier (a priori caractéristique de chaque espèce) peut également contribuer à une meilleure connaissance de ces trois espèces.

Pour toute question

Vienne Nature - Samuel DUCEPT
05 49 88 99 04 - samuelducept.vn@wanadoo.fr



AGIR pour la BIODIVERSITÉ

