Le Campagnol amphibie

un rongeur semi-aquatique protégé sur le plan national

CAMPAGNOL AMPHIBIE

Arvicola sapidus

Alain André

STATUT DE PROTECTION DE L'ESPÈCE

Européen..... Non protégée
National..... Protégée

AUTRES CLASSEMENTS

Liste rouge mondiale..... Vulnérable
Liste rouge Nationale..... Quasi menacée
Régional..... Déterminante ZNIEFF

Statut départemental : Assez commun

HABITAT

Le campagnol amphibie est un rongeur semi-aquatique qui fréquente indifféremment les plans d'eau calmes (étangs, mares…) et les cours d'eau. Toutefois il évite les zones à fort courant et affectionne les berges meubles pourvues d'une végétation rivulaires à hélophytes.

Dans le département de la Vienne, ce campagnol fréquente encore de nombreux cours d'eau notamment le Clain, la Vonne, la Boivre, la Vienne, la Gartempe ou la Charente. Il est aussi présent sur des sites abritant de nombreuses mares comme la Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Pinail ou le site des Grandes Brandes à Lussac-les-Châteaux.

COMPORTEMENT ET BIOLOGIE

Alors que la plupart des petits rongeurs sont essentiellement actifs la nuit, le campagnol amphibie montre, en toutes saisons, une activité diurne bien marquée, notamment en fin de matinée et début d'après-midi. Cette espèce autochtone (d'origine locale), ne crée pas de dégâts, ni aux berges, ni aux cultures : il n'est pas nuisible. Il fait partie de notre diversité biologique.

Régime alimentaire : Principalement végétarien, le campagnol amphibie consomme divers végétaux avec une préférence pour les Nénuphars blancs, *Nymphea alba,* entre mai et août.

Reproduction : La période de reproduction s'étend entre mars et octobre. L'accouplement a généralement lieu dans l'eau. Ce rongeur peut avoir 4 portées par an de 2 à 8 petits.

CYCLE BIOLOGIQUE SIMPLIFIÉ

	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Période de repro.				■	■	■	■	■	■			

MENACES

- Aménagement et destruction des milieux humides (curage, drainage, enrochement…).
- Campagnes d'empoisonnement à la bromadiolone contre le Ragondin et le Rat musqué.
- Piégeages non sélectifs.
- Baisse de la qualité et de la quantité d'eau.
- Compétition avec des espèces introduites (rat musqué, surmulot, …)

Risque de confusion avec des espèces proches

Campagnol amphibie (protégé)

Rat surmulot

Rat musqué (classé nuisible)

Ragondin (classé nuisible)

	Taille	Poids	Queue	Oreilles	Attitude en nage
Campagnol amphibie	petit 17-22 cm	150-280 gr	assez longue	très petites à peine visibles	assez haut sur l'eau
Rat surmulot	moyen/petit 21-29 cm	250-550 gr	longue, nue, annelée	assez grandes	allongée, assez enfoncée, les oreilles dépassent
Rat musqué	moyen, 30-34 cm	1-1,5 kg	aplatie latéralement noirâtre	petites peu visibles	assez enfoncée queue visible
Ragondin	grand 40-60 cm	5-10 kg	cynlindrique, écailleuse peu velue	petites mais visibles	épaules sous la ligne de flottaison

Alain André

Alain André

Michel Bramard

Transmettez-nous vos informations

Vienne Nature
14 rue Jean Moulin
86240 Fontaine-le-Comte

05 49 88 99 04
vienne.nature@wanadoo.fr

conception - réalisation : Thibaud Dumas - Vienne Nature, Photographie de couverture : Alain André, Dessins : Philippe Guesdon